

rapia vazhdoi për 2 ditë, duke e reduktuar, dhe në ditën e dhjetë pas ndërhyrjes e sëmura doli e shëruar nga spitali me një edemë të lehtë të palpebrës së sipërme (fig. nr. 3), e cila u normalizua pas disa ditësh. Nga kontrolllet e mëvonshme që iu bënë të sëmurës rezultoi se ajo nuk kishte ankesa subjektive dhe objektive dhe e ndiente veten plotësisht të shëndoshe.

Dorëzuar në redaksi më 9.8.1986



Fig. 3

## BIBLIOGRAFIA

- 1) Cepa Gj., Bimbli S.: Flegmonet e orbitës si komplikacion i proceseve inflamatorë odontogjene. Buletini i UT «Enver Hoxha» — Seria shkencat mjekësore, 1971, 2, 115.
- 2) Evdokimov A., Vasiljev G.: Hirurgičeskaja stomatologija, Moskva 1959, 157.
- 3) Rostikin H.: Spôsob operativnogo lechenija absesov u flegmon glaznici. Stomatologija, 1984, 2, 81.

## Summary

### AN ORBITAL PHLEGMONE OF DENTAL ORIGIN

A case is described of orbital phlegmone developing after extraction of tooth 6 and presenting diagnostic difficulties. In such suppurative forms, surgery should be considered as strongly indicated to prevent the possible local or general complications.

## Résumé

### UN CAS PHLEGMON ORBITAL D'ORIGINE DENTAIRE

Les auteurs décrivent un cas avec phlégmon orbital développé après une extraction dentaire (molaire 6) et qui présentait des difficultés diagnostiques. Dans les formes suppurées l'intervention chirurgicale doit être effectuée le plus vite possible afin de prévenir les complications locales et générales.