

## BIBLIOGRAFIA

- 1) Becklake M.: Chronic airflow limitation: Its relationship to work in dusty occupations. *Chest*, 1985, 88, 608.
- 2) Bosse R. et coll.: Age smoking inhalation and pulmonary function. *Archives of environmental health*, 1975, 30, 495.
- 3) Coal and the lung. Editorial *Thorac*, 1983, 38, 241.
- 4) Exposition à certains poussières minérales (silice, charbon): limites recommandées d'exposition professionnelles à visée sanitaire. Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS. Série de rapports techniques 734 OMS Genève, 1986.
- 5) Ferris B.: Chronic nonspecific respiratory disease in Berlin, New Hampshire 1961 to 1967. *American review of respiratory disease* 1973, 107, 110.
- 6) Fine L.J.: Studies of respiratory morbidity in rubber workers. *Archives of environmental health*, 1976, 31, 136.
- 7) Hankinson J. et coll.: Maximal expiratory flows in coal miners. *American review of respiratory disease*, 1977, 116, 175.
- 8) Jain B.L.: Ventilatory function in Nigerian coal miners. *British journal of industrial medicine*, 1981, 38, 275.
- 9) Johnson A. and coll.: Respiratory abnormalities among workers in an iron steal foundry. *British journal of industrial medicine*, 1984, 42, 94.
- 10) Kalacic I.: Ventilatory lung function in cement workers. *Archives of environmental health*, 1973, 26, 84.
- 11) Kibetis J.A. and coll.: Prevalence of bronchitis and airway obstruction in American bituminous coal miners. *American review of respiratory disease*, 1973, 108, 886.
- 12) Kleisbauer J. et coll.: Choix des paramètres fonctionnels respiratoires les plus discriminante dans une enquête épidémiologique sur la bronchite chronique. *Revue française des maladies respiratoires*, 1971, 5, 107.
- 13) Knudsen R.J.: Subclinical effects of amoking shest, 1984, 86, 20.
- 14) Krumholz R.: Pulmonary function differences in normal amoking and non-smoking midle-aged whute-collar workers. *American review of respiratory disease*, 1973, 107, 225.
- 15) Mahe E.: Medical surveillance for occupational respiratory disease: *Journal of occupational medicine*, 1975, 17, 519.
- 16) Montgomery et coll.: Pulmonary evalution of sandblasters. *Journal of occupational medicine*, 1975, 17, 523.
- 17) Morgan W KC et coll.: Ventilatory capanty and hung volumes of U.S. coal minere. *Archives of envivomental health*, 1974, 28, 182.
- 18) Olern U.G.: Pulmonary function exposed "contral workers in a nigerian nonsoapy detergent factory. *Archives of environmental health*, 1984, 39, 101.
- 19) Parient R. et coll.: Etude de la fréquence des bronchopathies chroniques en milieu agricole. *Revue française des maladies respiratois*, 1976, 4, 61.
- 20) Prefaut C.: Exploration de la fonction ventilatoire. *Revue du praticien*, 1985, 35, 941.
- 21) Regan J. and coll.: Coal worker's pneumoconiosis. Në: *Encyclopedia of occupational health and safety*, 1983, 490.
- 22) Selimaj E. e bp.: Ekzaminimet funksionale ventilatore të frysëmarrjes dhe bronkitik kronik. Kumtesë në Konferencën Shkencore të mjekësisë shqiptare 1986.
- 23) Skenderaj S. e bp.: Konsiderata mbi gjendjen e aparatit të frysëmarrjes në punëtorët e nëntokës. *Revista mjekësore*, 1985, 3, 5.
- 24) Speizer E.F.: Exposure to automobile exhaust: Pulmonary function measurements. *Archives of environmental health*, 1973, 26, 313.
- 25) Spinaci S. et altri.: Prevalenza della broncocontuzione funzionale ed individuazione dei gruppi a rischio in una popolazione industriale al lavoro. *Medicina del lavoro*, 1981, 72, 215.
- 26) Sarolli Y.: Dukuritë higjieniko-fiziologjike të punës në repartet e farkëtarisë së kombinatit të autotraktorëve «Enver Hoxha». Disertacion, 1984.
- 27) Sharp J.: A longitudinal study of bronchitis symptoms and spirometry in a midle-aged male industrial population. *American review of respiratory disease*, 1973, 108, 1066.
- 28) Shehati L. e bp.: Të dhëna higjenike dhe fiziologjike në disa punëtorë të

Disa të dhëna mbi ajrosjen mushkëriore të punëtorëve të nëntokës... 33

- 29) Shehati L. e bp.: Nivel i treguesve funksionalë të sistemit të frysëmarrjes në punonjësit e instrumentave abrazive. *Revista mjekësore*, 1984, 1, 14.
- 30) Ulmer W.T.: Die Lungen funktian: Physiologie und Pathophysiologie Methodik 1970. Stuttgart, 1970, 189.
- 31) Weill N.: Pulmonary function testing in industry. *Journal of occupational medicine*, 1973, 15, 693.
- 32) Zinskind M.M.: Occupational pulmonary disease. *Clinical symposia*, 1978, 30, 4, 14.

### Summary

### SOME DATA REGARDING THE LUNG VENTILATION OF MINERS AT THE VALIAS COLLIERY

The study comprised 457 undergroud workers at the Valias coal mine. The ventilatory function was found to weaken with the age and the time of occupational exposure in forms of both frequency and degree of the phenomenon. The vital capacity was found below the lower limit of the normal in 21.4 percent of the study contingent with prevalence of the milder cases. VEMS was less frequently affected than the vital capacity. The lung capacity on effort showed high figures in all age groups consequently the obstructive and mixed functional changes were comparatively rare (1.3%). Differences of the lung ventilation function between smokers and non-smokers were found in the values of KPPE. Smokers had lower KPPE than non-smokers, which indicates an increased resistance of the respiratory tract in the former.

### Résumé

### QUELQUES DONNEES SUR LA VENTILATION PULMONAIRE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE MINIES DE VALIAS

On a étudié 457 travailleurs de mines dans les mines de Valias. Il résulte une baisse des fonctions ventilatoires pulmonaires proportionnelles à l'âge et au temps d'exposition professionnelle des travailleurs. Les auteurs ont trouvé, chez 21,4% des sujets étudiés, une légère réduction de la capacité vitale à des niveaux quelque peu au dessous des valeurs normales; la réduction de la VEMS est moins accentuée que celle de la capacité vitale. Dans 1,3% des sujets étudiés la capacité vitale a montré des chiffres proches de la normale. Ainsi les modifications de caractères obstructifs et mixtes ont été rares. En outre il résulte des modifications plus évidentes de la fonction ventilatoire chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, qui est en rapport avec une résistance accrue des voies respiratoires chez les premiers.