

Summary**IDENTIFICATION OF T LYMPHOCYTES BY THE ROSETTE METHOD**

After some general considerations on lymphocytes and the current notions concerning the T, B and Null varieties, the paper discusses the importance of determining the ratio between T and B cells. It describes in particular the technique of identifying the T cells, the preparation of pure suspensions of mononuclear cells according to the Ficoll — Hypaque technique and the identification of T cells according to the rosette method.

Résumé**IDENTIFICATION DES LYMPHOCYTES T PAR LES ROSETTES**

L'auteur de l'article expose des considérations générales sur les lymphocytes en particulier du type T et le rapport quantitatif avec les lymphocytes de type B. L'identification des lymphocytes T est fait après avoir préparé les suspensions mononucléaires purifiées selon la méthode Ficoll-Hypaque. Enfin il est décrit la méthode d'identification des lymphocytes par les rosettes.

KUNDËRTRUPEZAT ANTIBËRTHAMORE TEK TË SËMURET ME POLIARTRIT REUMATOID

— ARBEN HOXHA —

(Laboratori imunologjik, Spitali klinik nr. 1)

Poliartriti reumatoïd është një sëmundje inflamatore kronike e indit lidhor, që prek sidomos mbulesën sinoviale të kyçeve. Prej saj sëmuren më shpesh femrat në moshën 20-30 vjeç ose në menopauzë (4).

Diagnostikimi i kësaj sëmundjeje duke u bazuar vetëm në shenjat klinike është i vështirë, pasi mund të ngatërrrohet me poliartritet me natyrë tjetër ose kolagjenozat (lupusin eritematoz të përhapur, sklerodermë etj.). Për këtë arsy, është e domosdoshme të kryhen një numër ekzaminimesh biologjike. Ndërmjet tyre, vendin më të rëndësishëm e zënë provat imunologjike: titri i komplementit serik, kërkimi i faktorit reumatoïd dhe i kundërtrupëzave antibërthamorë.

Përcaktimi i titrit të komplementit në serumin e të sëmurëve me poliartrit reumatoïd është një e dhënë biologjike shumë e rëndësishme që ndihmon për ta diferencuar nga lupusi eritematoz i përhapur. Në rastin e parë, ai është normal, kurse në të dytin është i ulur për arsyet të fiksimit në inde pas aktivizimit të tij me rrugën klasike. Ulja e titrit të komplementit tek të sëmuret me poliartrit reumatoïd mund të konstatohet vetëm në lëngun artikular të tyre (4).

Një tjetër shenjë biologjike shumë e rëndësishme tek këta të sëmure është gjithashtu edhe gjetja e faktorit reumatoïd nëpërmjet testit Valer-Roze, HEAT ose reaksionit gamalateks. Ai është një imunoglobulinë që përbën specifitetin kundërtrupëzor për përcaktuesit antigjenik të klasës IgG.

Gjatë poliartritit reumatoïd, tek një numër i konsiderueshëm të sëmuresh vërehet pozitiviteti i kundërtrupëzave kunderbërthamorë, por prania e këtyre të fundit nuk pasqyron shkallën e rëndesës së démtimit artikular gjatë kësaj sëmundjeje (2).

Objekt i studimit tonë është kërkimi i kundërtrupëzave kunderbërthamore tek të gjithë të sëmuret me poliartrit reumatoïd, pavarësisht në se e kanë apo jo të pranishme faktorin reumatoïd në serumin e tyre.

MATERIALI DHE METODA

Kemi kërkuar faktorin reumatoïd dhe kundërtrupëzave kunderbërthamore në serumin e 202 të sëmureve me poliartrit reumatoïd. Prej tyre, 148 (73.27%) ishin femra dhe 54 (26.73%) meshkuj. Si meshkujt,