

## Summary

## A CASE OF EBSTEIN ANOMALY

A case is presented of Ebstein's anomaly. In addition to the detailed description of the case, the paper discusses the principal signs and symptoms that characterize the anomaly, particularly with regard to the criteria of the echocardiographic diagnosis.

## Résumé

## UN CAS AVEC ANOMALIE D'EBSTEIN

Il est décrit un cas présentant une anomalie d'Ebstein. Après avoir décrit les signes cliniques, l'auteur met l'accent sur les critères échocardiographiques pour déterminer le diagnostic.

MBYLLJA PARËSORE E PLAGËS PERINEALE NË HEQJEN  
ABDOMINO — PERINEALE TË REKTUMIT

— ADELINA MAZREKU — AGIM KARAJ —

(Instituti Onkologjik)

Në mjekimin kirurgjikal të kancerit të rektumit nëpërmjet heqjes abdomino-perineale, deri në vitet 60 mbyllja parësore e plagës konsiderohet e pamundur. Përpjekjet e kirurgëve për mbylljen parësore të plagës perineale dualën me sukses fillimisht në trajtimin e prolapseve të avancuara të rektumit nëpërmjet të prerjeve korrigjuese të cilat treguan edhe për rezistencën e jashtëzakonshme të regjionit perineal ndaj kontaminimit të përkohshëm bakterial. Në vitet 70 mbyllja parësore e plagës perineale filloi të bëhet me sukses dhe në heqjet abdomino-perineale të kryera në të sëmuret me kancer të rektumit dhe sot kjo metodë përdoret në 60-90% të rasteve (1).

Nëpërmjet rastit që po paraqesim, do të theksojmë ato momente të teknikës kirurgjikale që bëjnë të mundur mbylljen parësore të plagës perineale.

## Paraqitja e rastit

Pacienti Q.S., 65 vjeç, shtrohet në repartin e kirurgjisë të Institutit të Onkologjisë më 3.12.1986, me diagnozën karcinomë rektale. Në ekzaminimin rektal konstatohet: masë ekzofite e ulceruar që zë 3/4-ën e cir-konferencës, 3 cm mbi marzhin anal; lumeni i rektumit i ngushtuar, lëvizshmëria e mukozës e kufizuar në paretin e përparmë. Ekzaminimi histologjik: adenokarcinomë infiltrative e rektumit.

Përgatitja paraoperatore u bë gjatë disa ditëve me dietë hiperkalorike me mbeturina të pakta dhe laksativë të lehtë, ndërsa në 24-orëshin para operimit me dietë hidrike, klizma pastruese dhe antibiotikë per-os (7 gram neomicinë 1.5 gram eritromicinë). Në mëngjesin e ditës së operimit regjioni perineal u la për 10 minuta me ujë të ngrohtë dhe sapun dhe u lye me tinkturë jodi. Heqja abdomino-perineale u krye me dy ekiye të njëkohshme më 9.12.1986.

Po përshkruajmë ato momente të teknikës operatore që ndihmojnë mbylljen parësore të plagës perineale.

Gjatë fazës abdominale, peritoneumi në nivel të mezozigmës e pjesës rektosigmoidale u pre në afërsi të zorrës, duke krijuar kështu lembo