

Foto 5




Foto 3c



Foto 4

- 3) Krause A.: Doe prothetische Versorgung bei kindern. Deutsche Stomatologie, 1982, 2, 166.
- 4) Langlad M.: Thérapeutique orthodontique. Paris, 1983, 15.
- 5) Pepa P. Toti F.: Anomalitë e numrit të dhëmbëve. Monografi, 1974.
- 6) Peault H.: Orthodontie sur adultes. L'Information dentaire, 1979, 16, 1345.
- 7) Toti F., Pepa P.: Anomalitë e numrit të dhëmbëve dhe mjekimi i tyre ortodontik. Buletini stomatologjik, 1980, 2, 52.
- 8) Schapira M.: Notiuni practice de stomatologie infartila. Bucuresti, 1983, 109.

Summary

THE NECESSITY OF ORTHODONTIC — ORTHOPEDIC TREATMENT

The paper discusses some problems rarely encountered in everyday orthodontic practice. It points out that all the children who need orthodontic and orthopedic intervention should first receive orthodontic treatment and after the elimination of the respective pathology should be submitted to orthopedic treatment aimed at preventing subsequent defects. Further the paper discusses the age most appropriate for orthopedic intervention and, after reviewing the opinion of various authors, draws the conclusions that there is no age limit, that after the first intervention the children should immediately be submitted to a second one.

The paper also explains the various types of anomalies of the teeth and the jaws that require intertwined intervention. These conclusions were drawn after analysing 183 children with various anomalies which were divided into two groups: 1) children who required only orthodontic treatment who were 100 and 2) children who required combined orthodontic and orthopedic treatment (83).

Résumé

L'INDISPENSABLE DANS LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE ET ORTHOPEDIQUE

Tous les enfants qui présentent des indications pour des procédés orthodontiques et orthopédiques doivent être, au début, par le voie orthopédiques et ensuite, après avoir éliminé les diverses anomalies il faut procéder par des méthodes orthopédiques pour prévenir les défauts tardifs. Les auteurs n'ont pas de préférence sur l'âge des enfants qui doivent subir l'intervention orthopédique. En outre ils ajoutent que les enfants, après la première intervention peuvent subir une deuxième. Les auteurs décrivent aussi les indications pour des interventions combinées qui présentent diverses anomalies des dents et des machoires.

Ces indications s'appuient sur l'analyse de 183 enfants avec diverses anomalies desquels 100 ont eu besoin de procédés orthopédiques et 83 de procédés combinés.