

## KUNDËRNDIKIMET

Amlopina është e kundërindikuar në shtatzëni, laktacion dhe në hypersensitivitet ndaj dihidropiridines.

Amlopina nuk duhet të përdoret nga fëmijët dhe adoleshentë nën moshën 18 vjeç.

## PARALAJMËRIM

Pacientët me funksion të dëmtuar të heparit duhet të kenë modifikime në dozim. Në pacientët me insuficencë hepatike një dozë prej 2.5 - 5 mg në ditë jep një përgjigje terapeutike të dëshiruar.

### Ndërveprimet medikamentoze

Deri me sot janë vërejtur ndërveprime jodomethënëse. Amlopina mund të shoqërohet me diuretikë

B - bllokues, ACE - inhibitors, nitratet ose nitroglicerina.

## PARALAJMËRIME TË VEÇANTA

Nuk është i nevojshëm ndonjë rregullim dozimi në pacientët e moshuar dhe pacientët me insuficencë renale. Amlopina nuk është e dializueshme.

Nuk është vërejtur ndonjë ndikim në aftësitë e pacientit gjatë dhënies së makinës, ose gjatë punës.

Mbani ilaçin larg fëmijëve.

## DOZA DHE PËRDORIMI

Doza e zakonshme fillestare nga goja është 5 mg një herë në ditë në angina pectoris dhe hypertension. Doza mund të rritet në 10 mg një herë në ditë kur duhet. Ushqimi nuk ndikon në efektin e ilaçit. Nuk ka nevojë për rregullim doze në pacientët e vjetër ose me insuficencë renale.

Pacientët me funksion të dëmtuar të heparit, kanë nevojë për modifikim të dozës. Përgjithësisht doza prej 2.5 - 5 mg në ditë jep përgjigje të dëshirueshme terapeutike.

### Mbidozimi

Të dhënat e sakta kanë treguar se mbidozimi i madh shkakton vazodilatation periferik ekstensiv me hypotension të dukshëm dhe mundësisht të zgjatur sistemik. Lavazhi gastrik mund të ndihmojë, sepse ngadalëson absorbimin e amlodipines. Masat standarte të ndihmës do të përdoren për të kryer lavazhin gastrik. Hypotensioni i dukshëm klinik në sajë të mbidozimit të amlodipines paraqet nevojën e menjëhershme të masave mbrojtëse për sistemin kardiovaskular.

## FENOMENET ANËSORE


Fenomenet anësore janë përgjithësisht të lehta dhe nuk sjellin nevojën e ndërprerjes së mjekimit. Si dihidropiridinat e tjera, efektet me të zakonshme anësore janë edema, dhimbje koke, skuqje, lodhje, të përziera, palpitacione. Amlopina nuk ndikon në gjendjen lipidike të serumit dhe vlerat laboratorike.

## PARAGITJA

Kuti prej 20 tabletave 5 mg  
Kuti prej 20 tabletave 10 mg.

Prodhuar nga:

Kompania farmaceutike dhe kimike




lek d.d.

Verovškova 57

Ljubljana, Slovenia

Lek. Ljubljana - ALB-AML-1150-C-9411-alb - Tiskarna Ljubljana, Ljubljana



<sup>®</sup>  
**Amlopin**  
amlodipine