

TË DHËNA PARAPRAKE MBI MJEKIMIN ORTOPEDIK TË DISFUNKSIONIT TË ARTIKULACIONIT TEMPOROMANDIBULAR

RUZHDIJE QAFMOLLA *

Summary

PRELIMINARY DATA ON ORTOPEDIC TREATMENT OF TEMPORO-MANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION

The author's aim is to determine the typical symptoms of temporo-mandibular joint dysfunction and to assess the preliminary data of the treatment. The author has followed and treated 37 patients aged from 20-60 within a two year period. The author after discussing the symptoms, estimates the orthopedic treatment data and comes to the conclusion that this treatment is successful in 70.6% of the cases, improvement in 17.6% and aggravation in 11.2%.

She also assesses that in order to preserve the achieved results it is indispensable to make the orthopedic treatment of the lost tooth setting a normal height of biting.

Dëmtimet në kyçin e nofullave janë pasojë e çrrregullimeve funksionale të vetë aparatit përtypës.

Për këtë arsyesh studimi i çdo patologjije të këtij kyçi duhet të bëhet në lidhje me okluzionin, artikulacionin e dhëmbëve, me mungesat e tyre etj.

Kyçi i nofullave preket nga sëmundje të ndryshme të shumta e të shumëlllojshme (8). Por patologjia më e shpeshtë e këtij kyçi është çrrregullimi disfunktional i tij. Schwartz dhe Costa vënë në dukje se sindroma disfunktionale është ajo gjendje patologjike, në të cilën nga shkaqe të ndryshme nofulla e poshtme shmanget nga trajektorja e saj normale (3). Të gjitha këto ndryshime ndodhin nga çrrregullimet e brendshme në kyçin e nofullave. Këto ndryshime shfaqen me dhimbje, shmangje ose kufizim të hapjes së gojës, kërcitje në kyç dhimbje koke, fytyrë etj.

Sipas studimeve të bëra nga Ene, Hartman, Soudant, si edhe nga studimi i ynë rezulton se simptoma e dhimbjes mbizotëron në më shumë se 73.2% të rasteve (4, 5). Për shfaqjen e simptomës së dhimbjes ka mendime të ndryshme (6). Disa pohojnë se dhimjet janë pasojë e spazmave muskulare, autorë të tjerë shfaqjes së dhimbjeve ja dedikojnë streseve psiqike dhe shfaqja e kontakteve të parakohshme (6). Për mendimin tonë: çrrregullimet neuro-muskulare dhe okluzo-artikulare ndikojnë në lindjen e kësaj simptome. Kërcitja në kyçin e nofullave është shenja që haset shpesh në patologjinë disfunktionale. Disa autorë e kanë ndeshur atë përkatesisht në 19%, 17%, 21% (3,4).

Ndërsa ne e ndeshëm në 58.6% të rasteve. Kërcitja mund të jetë e njënshtme ose e dyanshme (1,4). Te të sëmurë të tillë vihet re edhe kufizimi i hapjes së

gojës, e cila paraqitet për arsyen e dhimbjeve të fortë që ka i sëmuri gjatë lëvizjes së gojës.

Për të zbuluar këto shenja klinike duhet të bëhet ekzaminimi klinik i cili ka rëndësi të veçantë në vlerësimin e të sëmureve. Duke u nisur nga të dhënët klinike ne mjekuan në mënyrë ortopedike të sëmure me disfunktione të kyçit të nofullave. Kjo mënyrë mjekimi ka për qëllim vendosjen e kondilit në një pozicion më të përshtatshëm në fazën glenoïde, duke krijuar qetësi për diskun artikular, i cili në disfunkcion paraqet ndryshime funksionale.

Qëllimi i studimit

Duke qenë se dëmtimi i ATM-së shprehet me një simptomatologji që mbetet për shumë kohë në qoftë se nuk mjekohet sa duhet, atëherë në kë studim i vumë vetes për qëllim që:

1) Të përcaktojmë simptomatologjinë tipike që i përket disfunktione të ATM-së.

2) Të vlerësojmë se cilat janë të dhënët paraprake të mjekimit ortopedik të disfunktione të ATM-së.

Materiali dhe metoda

Për dy vjet rresht (1987-1989) mjekuan 37 të sëmure me moshë nga 20-60 vjeç.

Sipas materialit tonë përqindjen më të lartë e zënë femrat siç shihet nga pasqyra nr.1 me 71.3% në krahasim me meshkujt 29.3%. Sipas të dhënave të literaturës boshkëkohore si edhe nga studimi i autorëve tanë (2), del se kjo sëmundje takohet më shpesh te gratë

* Dërguar në redaksi 9 shkurt 1990, miratuar më 20 Qershor 1990. Nga Katedra e Terapisë Stomatologjike të Universitetit të Tiranës (R.Q).

Adresa për letërkëmbim: R.Qafmolla, Katedra e Terapisë Stomatologjike të Universitetit të Tiranës.