

RREZIQET PASOPERATORE NË PERITONITET E SHKAKTUARA NGA APENDICITI AKUT

MIÇO XHAFERI *

Summary

POST-OPERATORY RISKS IN PERITONITIS CAUSED BY ACUTE APPENDICITIS

The study done in 110 patients with appendectomy testified completely that the risk parametres are:

- 1) The age of the patients.
- 2) The anatomopathological condition of appendix.

There were left untestified the connection between the day, the shift in which the operation is carried out and the experience of the surgeon in the development of complications.

It was cerified statisticallay that postoperative wound disturbances take with themselves another one-day postoperative stay in the hospital.

We must stress that in order to avoid complications and the postoperative stay, special attention should be paid to the age of the anatomopathologic condition of appendix.

Qëllimi i studimit

Ndërhyrja kirurgjikale në apendicitin akut në Spitalin e Sarandës zë 30% të punës sonë. Ë studiuan 110 raste të operuar urgjent në repartin e kirurgjisë, të krahasuara me 50% të sëmurë me apendicit kronik.

1) Ndikimi i moshës, shkallës së inflamacionit të apendiksit ditës dhe turnit të kryerjes së operimit në shpeshësinë e ndërlikimeve pasoperatore;

2) Ndikimi i shkallës së inflacionit në ditëqëndrimin pasoperator.

Rezultatet

Pasqyra Nr.1.

| Mosha vjeç | 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ndërlikimet pasoperatore | - | 6.8% | 6.7% | 9.7% | 28.5% | 28.5% |

Pasqyra Nr.2. Ditëqëndrimi pasoperator lidhur me gjendjen anatomopatologjike të apendiksit.

| | 5 ditë | 6 ditë | 7 ditë | 8-10 ditë | 11-14 ditë | 15 ditë |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------|---------|
| Forma katarale ose dhe flegmanoze | 15.5% | 54% | 15.5% | 9.8% | 0.8% | 4% |
| Forma gangrenoze | - | 33.3% | 16.6% | 16.6% | 33.3% | - |
| Plasja | - | - | - | 14.2% | 28.5% | 57.1% |
| Forma kronike | 33.3% | 25% | 16.6% | 25% | - | - |

Pasqyra Nr.3. Ndërlikimet pasoperatore lidhur me gjendjen anatomopatologjike të apendiksit.

| Forma anatomopatologjike | Ndërlikimet % |
|-----------------------------|---------------|
| Katarale ose dhe flegnaroze | 8.8% |
| Gangrenoze | 71.4% |
| Plasja | 71.4% |
| Kronike | - |

* Dërguar në redaksi për botim më 7 gusht 1990, miratuar për botim më 3 janar 1991. Nga spitali i rrethit Sarandë (N.Xh).
Adresa për letërkëmbim: M.Xhaferi. Spitali i rrethit Sarandë.