

Lemboja muskulokutane e latissimus dorsi dhe aplikimi i saj praktik Gjergji Belba	88
Desensibilizimi me aspirin në të sëmurët me sindromë Fernand-Widal Etleva Qirko, Alfred Priftanji	94
Diabeti i sheqerit dhe mikroangiopatia diabetike Thanas Fureraaj	97
Manifestimet ekstrahepatike të sëmundjes Wilson në vendin tonë Josif E. Adhami, Paskal Cullufi	102
Indeksi i nevojës së trajtimit ortodontik (IOTN) dhe përdorimi i tij në Shërbimin Ortodontik. Studim epidemiologjik Virgjini Mulo	106
Artikuj të përmbledhur	116

The musculo-cutaneous flap of Latissimus Dorsi and her practical application Gjergji Belba	88
Desensitization with aspirin of the patients with syndrome Fernand-Widal Etleva Qirko, Alfred Priftanji	94
Diabetes Mellitus and diabetic microangiopathy Thanas FureraJ	97
Extrahepatic manifestation of Wilson's disease Josif E. Adhami, Paskal Cullufi	102
Index of orthodontic tratment need Virgjini Mulo	106
Abstracts	116

NOVARTIS

DIOVAN

Antihipertensiv, Antagonist I receptorëve të angiotensinës II (nën tipi AT₁)

Përbërja:

Principi aktiv, valsartan
1 kapsulë përmban 80mg valsartan, 160mg valsartan

Mekanizmi i veprimit:

Hormoni aktiv i sistemit të renine – angiotensine – aldosteron (SRA) është angiotensina II. Ajo formohet duke u nisur nga angiotensina I me ndërmjetësimin e enzimës së konvertimit të angiotensinës. Angiotensina II lidhet me receptorët specifikë të vendosura në membranat qelizore të indeve të ndryshme. Angiotensina II është një vazokonstriktor i fuqishëm që rrit në mënyrë direkte TA. Valsartan, per os, është një antagonist efikas dhe specifik i receptorëve të angiotensinës II. Ai vepron në mënyrë selektive mbi receptorët AT që janë përgjegjës për efektet e njohura të angiotensinës II. Valsartani nuk aksion inhibues mbi enzimën e konvertimit (e quajtur gjitha-

shtu kininazë) që gjithashtu degradon bradikininën.

Efektet terapeutike:

Administrimi i DIOVAN-it tek pacientët hipertonike lejon të arrihet ulja e tensionit, pa modifikimin e frekuencës kardiake.

Efekti antihipertensiv manifestohet brenda dy orëve tek shumica e pacientëve pas një doze orale unike. TA maksimal ulet mbas 4-6 orësh. Efekti antihipertensiv persiston për 24 orë. Mjekimi vazhdon për një kohë të gjatë. Kombinimi i valsartan me hydrochlorthiazidë lejon që TA të mbahet nën kontroll.

Insuficienca hepatike:

Rreth 70% e dozës së obzervuar eliminohet në rrugë biliare.

Indikacionet: Hipertension arterial esencial, diskret dhe i moderuar

Posollogjia/ Mënyra e përdorimit:

Rekomandohet një herë në ditë 80mg, preferohet në mëngjes gjatë ushqimit. Brenda 4 javësh kuptohet efekti maksimal i mjekimit.

Kundërrindikimet:

Gravidanca
Nuk ka ndërveprime me medikamente të tjerë.

NOVARTIS

Novartis Scientific Office
Rr: "Beqir Luga" Pall i Ri,
Kat.III
Tel. +355 42 324 44
Fax: +355 42 308 43
P.O. Box 2936
Tirana - Albania

NJOFTIM

PËR MJEKË, FARMACISTË, PACIENTË, QYTETARË

Me kërkesë të mjaft profesionistëve dhe qytetarëve të thjeshtë po sqarojmë dhe saktësojmë dhe një herë publikisht: Barnat Origjinale të njohura, Ligjore, me Efektivitet të garantuar të Firmave Farmaceutike Zviceriane CIBA – GEIGY dhe SANDOZ, sot NOVARTIS, kanë mbishkrime, etiketa dhe fletën shoqëruese në Anglisht, Frëngjisht dhe/ose Gjermanisht, nuk kanë as vula, as pulla shtesë dhe shpërndahen në Shqipëri vetëm nga grosistët e autorizuar, "FUFARMA" dhe "ALB – TRADE", Tiranë. Barna me emra të njëjtë, por me mbishkrime - etiketë dhe fletë shoqëruese në gjuhët: Greke, Italiane, Turke, Bullgare ose të tjera sllave, si dhe me vula e pulla, nuk janë ligjore se vijnë nga burime e rrugë të dyshimta e si të tilla nuk kanë garanci efektiviteti dhe vërtetësie, dhe për të cilat nuk mbajmë asnjë përgjegjësi.

Për këtë problem kanë dijeni Autoritetet kompetente Shtetërore dhe Private. Për çdo informacion jemi në dispozicionin tuaj.

**Zyra Përfaqësuese e NOVARTIS Pharma Service Inc.,
Tiranë - Shqipëri**