

SINDROMA DERMORESPIRATORE TEK FËMIJËT 3 MUAJ -15 VJEÇ

HATIXHE LUKA*

Summary

DERMORESPIRATORIES SYNDROMS IN CHILDREN AGED 3M-15 YEARS

Asthma and atopic dermatitis are two diffused allergical diseases who begin from childhood and who constitute a very important sanitary and social problem. This two diseases form the syndrom of dermorespiratory, such named from 1932-1935 by Sulberger and Coca. The allergical diseases became increased for the reason of the allergic charge of industrial cities atmosphere.

This study is based on the experience of our allergical clinic to help with medical aid the pediatric physicians to diagnose as soon as possible this syndrom, for adequate treatment of them, to prevent the chronic status of disease, who comport in several times, the handicapity of patients.

In this study we have observed some epidemiological dates us:

The age of disease beginning, increasing of the disease according the sex, the residence of patients, atopic familiar state so the role of polysensibilisation and cow's milk nourishment in this syndrome.

Materials and results:

The material is composed from 60 cartels (diseases diagnosis) of children aged 3 months till 15 years of pneumoallergical service near the consultant chair. The studies are made during 8 years (1986-1993).

In our results we have seen that the children of cities are 75% more affected than the females in ratio 3:1.

The children nourished with cow's milk during first 4-5 months have the chance to be affected more than the maternal nourished children.

The heredity is positive in 60% of cases; periferic blood eosinophiles increased in 78% of cases, the eosinophyle of material are increased with 15% of cases and total Ig measured by Elisa method is founded over 600 UI/ml (the normative) in 65% of cases.

Conclusions:

Dermorespiratory syndrom affect more the children of cities, males and children nourished with cow's milk. One of predisposed factories is the atopic terrain. The polysensibilisation has a very important role in the treatment of this disease.

Sëmundjet alergjike për nga shpeshtësia dhe rëndësia përbëjnë një problem të rëndësishëm shëndetësor dhe shoqëror, duke u bërë shkak invalidizimi për të gjitha moshat. Sot sëmundjet alergjike vijnë duke u shtuar, sepse shtohen edhe alergjenet në atmosferë, e cila ndotet vazhdimisht për shkak të rritjes së industrializimit dhe zhvillimit të degëve të ndryshme të industrisë. Kështu shpeshtësia e astmës në shumë vende të botës varion nga 4 deri në 10%, ndërsa dermatiti atopik 1-3%.

Sindromi dermorespirator përmbledh dy sëmundjet kryesore alergjike: asthmën dhe ekzemën, të cilat kombinohen në mënyra të ndryshme. Këtë sindrom e zbuloi Breet-Ratther dhe bashkëpunorë në 1951.

Përsa i përket mekanizmave fiziopatologjike, me gjithë studimet e shumta nuk është arritur një konkluzion përfundimtar. Megjithatë mund të themi që sëmundjet alergjike kanë si bazë terrenin atopik, i cili nga ana e tij ka si faktor bazë zhvillimin konstitucional. Kjo domethënie është akoma hipotezë. Pra baza patologjike e sindromës dermorespirator është nga njera anë

blokim i B-receptorëve dhe nga ana tjetër shkatërrimi i T- limfociteve supresiore dhe qelizave fagocitare.

Duke u nisur nga fakti se jo rrallë kjo sëmundje nuk diagnostikohet në kohë duke e marrë ekzemën si sëmundje e moshës së vogël që duhet të kalohet dhe nuk i vihet rëndësi nga prindërit për të parë fëmijën tek mjeku, sidomos kur kjo është e formës së lehtë ose të mesme ose kur shpesh fenomenet respiratore merren si bronkite ose bronkopneumoni të thjeshta, si edhe fakti që kjo sindromë të çon në invalidizim, na shtyn të marrim një studim të tillë që deri tani nuk është marrë nga pediatri e vendit tonë. Ky studim do të kontribuojë sado pak në njohjen më të plotë dhe kapjen e hershme të kësaj sindrome nga mjeku pediatër i përgjithshëm, detyrë që ja vumë vetes kur përcaktuam qëllimet e këtij studimi.

Në realizimin e qëllimit të këtij punimi i vumë vetes këto detyra kryesore:

Të vemë në dukje karakteristikat e shpërndarjes së kësaj sindrome sipas seksit, vendbanimit, moshës kur fillon ekzema dhe asthma, stina kur acarohet

* Dërguar në Redaksi më 15 Korrik 1995, miratuar për botim në 21 Dhjetor 1995.

Nga Shërbimi i Alergologjisë Pediatrike i Qendrës Spitalore Universitare, Tiranë

Adresa për letërkëmbim: H.Luka. Shërbimi i Alergologjisë Pediatrike i Qendrës Spitalore Universitare, Tiranë.