

DUKURITË E LËKURËS NË HEMOPATITË MALINJE

TATJANA CAJA, PAL XHUMARI, POLIKRON PULLUQI, ILIRIANA RUKA, THOMA KETRI, ARBEN IVANAJ, SOTIRAQ LAKO*

Summary

THE SKIN PHENOMENONS ON MALIGNANT HEMOPATHICS

Background: Skin lesions are not rare in patients with hematological malignancies. The patients were studied to evaluate their clinical and laboratory features, etiopathological factors responsible for skin lesions and outcome of the illness. They comprised of the following six groups: acute leukemia (AL) 153 cases, chronic lymphoid leukemia (CLL) 114 cases, chronic myeloid leukemia (CML) 109 cases, lymphoma 224 cases, myelodysplastic syndrome 13 cases (MS), multiple myeloma (MM) 88 cases.

Results: Among patients with AL, 56 cases developed skin lesions; 29 cases of CLL patients, 14 of CML patients, 8 of lymphoma patients, 1 of MS patients, 8 of MM patients had skin lesions.

The important etiopathological factor for skin lesions in hematological malignancies in 69.8% of patients.

In conclusion our study confirms that skin lesions are commoner in patients with AL occurring in 35.2% CLL 25.4% and CML 12.8% than in those with lymphoma (3.5%), MS (7.7%) or MM (9%).

Lezionet e lëkurës gjenden në të sëmurët me hemopati malinje nga shkaqe të ndryshme. Imunodeficienca e fituar ndodh si rezultat i kimioterapisë për malinjitetin, përdorimit të kortikosteroideve, imunosupresorëve, radioterapisë. Antitruapat jo normale rriten, antitruapat normal redukohen, e si rezultat infeksionet rriten. Nga ana tjetër kimioterapia nga ana e saj dhe fibroza e palcës së kockave që ajo jep rrit po ashtu riskun për infeksione.

Qëllimi i studimit tonë është për të parë se sa shpesh dukuritë e lëkurës shoqërojnë hemopatitë malinje, e cila është hemopatia malinje që shoqërohet më shpesh me dukuri në lëkurë.

Materiali dhe metoda

U morën në studim 707 të sëmurë me hemopati malinje (leukoza akute, leukoza limfoide kronike, leukoza mieloid kronike, mieloma multiple, mielodizplazi, limfoma), të shtruar në klinikën e hematologjisë të QSUT-së gjatë 10 vjetëve (1991 - 2000). Studimi u bazua në të dhënat klinike dermatologjike që paraqitnin të sëmurët shpesh në bashkëpunim me dermatologun të dokumentuar në kartelat dhe fishat e tyre.

Të sëmurët u analizuan sipas llojit të hemopatisë malinje në vite, llojit të dukurive në lëkurë, kohën e shfaqjes së dukurive në lëkurë në lidhje edhe me kohën e diagnozës e me stadin e hemopatisë malinje.

Rezultatet

Dukuritë e lëkurës në leukozë akute

Ekimoza	14 raste	25%
Petekie	15 raste	26,8%
Ekimoza+Petekie	25 raste	44,6%
Infiltrime nën lëkurë	1 rast	1,8%
Eritema Polimorfe	1 rast	1,8%

Koha e shfaqjes së dukurive në lëkurë në lidhje me kohën e diagnozës në leukozë limfoide kronike

Tabela nr.1

Para diagnozës	Koha e diagnozës	Pas diagnozës
5 raste	7 raste	17 raste
17.2%	24.1%	58.5%

* Dërguar në Redaksi në 6 Nëntor 2002, miratuar për botim në 15 Mars 2003.

Nga Shërbimi i hematologjisë i Qendrës Spitalore Universitare Tiranë (T.C.)

Adresa për letërkëmbim: T. Caja: Shërbimi i hematologjisë i Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës.