

LESCOL[®] XL

LESCOL

GJITHÇKA QE JU PRISNI NGA NJE STATIN

LESCOL[®] XL
80 mg
FLUVASTATIN SODIUM

LDL-C

-38%*

Reduktim
Sinjifikativ

LDL-C (mmol/L) nga 2.60 në 1.64
(LDL-C (mg/dL) nga 100 në 63)

HDL-C

+21%†

Kryeson
Klasifikimin

Prezantimi i HDL-C (mmol/L) nga 1.04 në 1.26
(HDL-C (mg/dL) nga 40 në 50)


TGs

-31%§

Ulje
Dramatike

TGs (mmol/L) nga 2.26 në 1.56
(TGs (mg/dL) nga 200 në 135)

LESCOL[®] 80 mg
FLUVASTATIN SODIUM




Përthithja e statinave

NOVA

Besimi fituar nga eksperien

- Fluorokinoloni i vetëm që ushtron veprim lokal në traktin urinar
- Niveli antimikrobial është i përqendruar kundër bakterieve që shkaktojnë infeksione të traktit urinar
- Anisepiku urina më efektiv në trajtimin dhe profilaksinë e infeksioneve të traktit të parastit urinar



NOLICIN

tableta
uriflo

Informacion i përbledhur mbi mënyrën e përdorimit

Spektri antimikrobial: Bakteriet aerobe gram-negativë, përfshirë *Pseudomonas aeruginosa*, dhe stafilokokun. **Indikacionet:** Infeksione akute dhe kronike të traktit urinar, prostatit kronik bakterial, gonorea; parandalim i infeksioneve të traktit urinar që përsëriten shpesh; parandalim dhe trajtim i infeksioneve bakteriale të traktit gastrointestinal (diarrea e udhëtarit); parandalim i infeksioneve gram-negativë tek pacientët e imunokompromentuar. **Dozimi:** 2 x 1 tablete në ditë, kohëzgjatja e trajtimit varret nga indikacioni. Për trajtimin profilaktik të infeksioneve të traktit urinar që përsëriten shpesh dozimi është gjysmë tablete në ditë, e marrë në mënyrë, për 1 ditë 2 vjet. Për parandalimin e diarresë së udhëtarit dozimi është një tablete në ditë. Trajtimi duhet filluar një ditë para njes, duhet vazhduar gjatë udhëtimit si edhe dy ditë pas kthimit (nuk rekomandohet zgjatja e trajtimit për më shumë se 21 ditë). Për parandalimin e sepsis gram-negativë në pacientët neutropenike dozimi është 2 x 1 tablete në ditë deri 8 javë ose gjatë fazës neutropenike. Doza ditore maksimale është 400 mg. Pacientët duhen kontrolluar ta marrin Nolicinën një orë para ose dy orë pas ushqimit. Në funksion renal të demtuar (klieransi i kreatinës më pak se 0.33 ml/s ose niveli i kreatinës në serum më shumë 400 µmol/l), doza duhet përgjysmuar ose duhet dyfishuar interвали midis dozave. Tek pacientët në hemodializë, me diurezë të mbajtur, doza duhet përgjysmuar, ndërsa tek ata në CAPD nuk nevojitet rregullim doze nese diureza mbahet. **Efektet anësore:** Shqetësime gastrointestinale, dhimbje koke, marrje mendsh, reaksione alergjike. Tek pacientët e moshuar mund të shfaqet lodhje, përgjumje dhe konfuzion. Mund të ndodhin ndryshime në disa rezultate laboratorike. Fluorokinolonet mund të shkaktojnë shumë rrallë, zakonisht në kombinim me faktore të tjerë të dëmshëm tendinca ose ruptura të tendinit. **Ndërveprimet:** Qumështi, kosi, antacidet, sukralfati, dhe preparatet që përmbajnë hekur dhe zink zvogelojnë absorbimin e Nolicinës. Marrja e njëkohshme e Nolicinës me teofilinë ose ciklosporinë rezultojnë në rritjen e përqendrimit të kesaj të fundit në serum. Marrja njëkohshme e Nolicinës dhe varfarinës mund të mëzojë efektin terapeutic të varfarinës. **Kundërintikacionet:** Mbingjeshtëri ndaj barit ose kinoloneve të tjera, shatzani dhe ushqyerje me qumësht, fëmijë. **Masa paraprake:** Gjatë gjithë trajtimit duhet mbajtur diurezë normale. Është i nevojshëm kujdes tek pacientët me shqetësime në SNO. Pacienti duhet të evitojë ekspozimin e tepruar ndaj rrezeve të diellit dhe forcimit fizik ndërsa është nën trajtim. **Paralajmërimi të veçantë:** Nolicina mund të shkaktojë marrje mendsh duke ulur keshur, kohën e reagimit të pacientit, veçanërisht nese merret bashkë me alkoolin. **Ambalazhimi:** 20 tableta 400 mg.

Për informacione të mëtejshme drejtohuni tek prodhuesi



Zyra e Përqasjes në Tiranë
Rr. Sami Frashëri, P. i Aviacionit,
Shëresa 1, Ap. 5
Tiranë
Tel: (04) 250 597
Fax: (04) 250 597

crahun
RET/
ntuar,
RIÁ të
iRFG/

linjat

venoz,
gulant,
aktimit
532 bp)
metodën
nation
ën pasi
HRPE
opike).
gmente
ione në
orur në
nga T7
zicionit
e PCR,
kërkuar
nasën e
t u krye

ërkët 4
tët (rasti
gjëndje
shtrua
logjitë
tretë u
shtruan
e, femër
kancer
i fundus
pertosfi

ëve për
moresh
kull 38
smoide.

Për një cilësi jete më të mirë

Rp: Flixotide

FLUCASONI PROPIONATI



GlaxoSmithKline

Për informacion më të zgjeruar drejtoheni në

Tel/fax (04) 372 972 / 376 141

Rruga Elbasanit, Nr.33/I, Tiranë

www.gsk.com

Buletini i Shkencave Mjekësore

Organ i Universitetit të Tiranës

Buletini i Shkencave Mjekësore

Boton punime origjinale me nivel të lartë shkencor në lëmin e mjekësisë. Punimet mund të jenë me karakter klinik dhe laboratorik. Buletini është i pajisur me tabelën e përmbajtjes dhe abstrakte në anglisht.

Kryeredaktor : BARBULLUSHI Myftar

Anëtarë të Redaksisë: BASHO J, GLIOZHENI O, GODA A, GODO A, KAÇANI N, KRUJA J, KONDILI A, PRIFTANJI A, MARKU N, QAFMOLLA R, REFATLLARI A, TASE M.

Redaktor letrar: Nevina Gami

Faqosja: Ema Hoxha

Konsulentë të Redaksisë

BULO A.	PANO K.
CIKULI M.	PETRELA M.
ÇAKËRRI L.	QIRKO S.
ÇELA M.	RADOVANI P.
DEDA L.	RESULI B.
DEGA S.	SELIMAJ E.
KAKARIQI E.	SULI A.
KAPISYZI P.	SULÇEBE G.
KERRAJ F.	TASE M.
KONE E.	TUSHE E.
KOROSHI A.	YLLI A.
MAZREKU A.	XHANI M.
MINGA GJ.	XHUMARI P.

Bordi Konsultativ Ndërkombëtar

CIVATI G.	/Milano, Itali
D'AMATO G.	/ Itali
KASTRATI A.	/Mynih, Gjermani
KEITH F.	/California, U.S.A.
LEYNADIER F.	/ Paris, Francë
MIGLIORI P.A.	/ Padova, Itali
MILLIEZ J.	/ Paris, Francë
MORONI M.	/ Milano, Itali
PADRINI P.	/ Itali
VERGOULAS G.	/ Thessalonikis, Greqi
SCHENA F.P.	/ Bari, Itali
SPASOVSKI G.	/ Maqedoni

Botimet: Letërkëmbimet lidhur me botimet dërgohen në këtë adresë:
Myftar Barbullushi, Kryeredaktor i Buletinit të Shkencave Mjekësore.
Qendra Spitalore Universitare Tiranë
Rruga e Dibrës, Nr. 370, Tiranë
Tel.: 042-336-44, Fax: 068 20 45638
Udhëzime për Autorët gjenden në çdo numër. Autorët duhet të njihen me këto udhëzime para se të dërgojnë dorëshkrimet për botim.

Adresa për abonimet: Buletini i Shkencave Mjekësore
Fakulteti i Mjekësisë
Rruga e Dibrës Nr. 371, Tiranë
Tel.+Fax:043-627-10
E-mail: facmed@albaniaonline.net

Reklamat:

Revista pranon të botojë reklama për prodhime mjekësore dhe lajmërimet të ndryshme në fushën e mjekësisë. Tarifat për këtë qëllim vendosen me marrëveshje.

Adresohuni:
Buletini i Shkencave Mjekësore
Fakulteti i Mjekësisë
Rruga e Dibrës Nr. 371, Tiranë
Tel.+ Fax: 043-627-10
E-mail: facmed@albaniaonline.net

Botimi i Reklamave nuk do të thotë se Revista jep garanci për prodhimet përkatëse dhe as se i mbështet pretendimet e prodhuesit.