

RISHFAQJET PERISTOMALE PAS LARINGEKTOMISE TOTALE

BESIM BOÇI, JETMIRA FEJZA*

Summary

PERISTOMAL RECIDIVES FOLLOWING TOTAL LARYNGECTOMY

Aim of the study: the aim of the study is to evaluate the peristomal recurrences in patients wich performed tracheotomy before total laryngectomy for obstructive laryngeal cancer.

Methods: the material consisted of 151 patients wich were treated in our clinic during 2002-2003. 70% of patients presented during the year 2002 and 75% of patients presented during the year 2003 had advanced stages of laryngeal cancer and 11 of them needed emergent tracheotomy.

Results: all patients wich performed emergent tracheotomy before total laryngectomy had presented peristomal recidives in a period of time wich range from 8 to 18 months after definitive surgery.

Conclusions: the frequent peristomal recidives suggested us to do total laryngectomy no latter than 48 hour after emergent trachetomy.

Trakeostomia është një procedurë e cila konsiston në hapjen e një dritareje në murin e përparshëm të trakesë dhe mund të bëhet për qëllime terapeutike ose mund të jetë një procedurë e zgjedhur. Trakeostomia, përveç sëmundjeve inflamatore të laringut mund të kryhet edhe si një masë paraprake në operacionet për neoplazmat orofaringeale ose laringeale për të shmangur manipulimet e panevojshme me tumorin.

Në shërbimin tonë përveç situatave të mësipërme trakeotomia kryhet për sigurimin e rrugëve të frymëmarrjes në stadet e avancuara të kancerit të laringut kur masa tumorale ka bllokuar plotësisht hyrjen e laringut.

Materiali dhe metoda

Për të kryer këtë punim janë marë në studim rastet e trajtuara në shërbimin e ORL-së me kancer të laringut në vitet 2002-2003. Janë përfshirë në studim 151 të sëmurë, nga të cilët 143 ishin të seksit mashkull dhe 8 të seksit femër. Ne kemi marë në studim vetëm të sëmurët që janë paraqitur në stadin III dhe IV të cilët janë trajtuar me laringektomi totale dhe më pas me radioterapi. Nga 151 raste i janë nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale vetem 102 raste dhe nga këta 11 raste kanë kryer trakeotomi para laringektomise totale. Të gjithë të sëmurët që kanë kryer laringektomi totale pas ndërhyrjes i janë nënshtruar radioterapisë.

* Dërguar në redaksi në Mars 2008, miratuar në Qershor 2008.

Nga QSUT "Nënë Tereza, Shërbimi i ORL-së.

Adresa për letërkëmbim: Boçi B.: QSUT "Nënë Tereza, Shërbimi i ORL-së.