

RAST ME HERPES ZOSTER MULTIPLEX ATIPIK

ALI A. SULA*

Summary

A CASE OF ATYPICAL HERPES ZOSTER MULTIPLEX

A case of atypical Multiplex Herpes Zoster is reported with three eruptive hubs. During its course pain was not the main symptom, and it was not even present in the early phases. Injury of the motoric nerves was heavier than the sensitive ones, leaving a steady sequel: the hypotrophy of the quadriceps femoral muscle.

The article stresses the increasing incidence of the disease in the fourth ages, as a result of the aging of the population, as well as the prophylactic role of the vaccine against the threat of the recidivism, most frequent in this stratum of the population

Herpes Zoster (HZ) është manifestim i vonë i një viroze me ecuri bifazike, infektim në të cilin shfaqja klinike pararendëse është variçela. Shkaktari i njëjtë është herpes virusi human 3.

Sëmundja është e njohur në popull me emërtime të ndryshme (zjarrth i natës, fuoco di s. Antonio, shingles) për dhembjen e beftë si prej thike (më shpesh në gjoks), që i paraprin me 2-3 ditë një shpërthimi kalimtar herpetik. Me kapërcimin e këtij fillimi të mprehtë, do të jetë neuralgja post-herpetike ajo, që do të bëjë të sëmurin të vuajë me muaj ose më gjatë.

Ndryshe nga ky kuadër karakteristik, në praktiken mjekësore ndeshen raste të rralla me atipi të shenjave dalluese, qofshin këto përsa i përket dhembjes, ekzantemës ose dëmtimeve të strukturave nervore-shënjestër me pasojat relative. Kështu janë vërejtur forma bilaterale, lokalizime në fytyrë (sindromi Ramsay-Hunt me

paralizë faciale) në sy, në veshë, medule spinale, forma visherale, HZ pa herpes, etj.

Rasti i paraqitur dallohet për disa veçori.

Përshkrim rasti

Pacienti 84-vjeçar, S.A., pas një episodi të zgjatur shqetësimesh të natyrës virale (subfebrilitet, kollë, diarre), ndjen për një çast një pickim të lehtë në regjionin sakral ku, pak djathtas vijës mesore i diktohet një tufë fshikëzash mbi lëkurën ngjyrë mavi të errët në një sipërfaqe sa pëllëmba e dorës. Më pas, në faqen e brendshme të kofshës u vërejtën, të shpërndarë, katër elementë fliktenulare me përmbajtje lehtësisht të turbullt.

Të gjitha këto shfaqje lokale ishin dhe mbeten të padhembshme, qoftë edhe gjatë manipulimeve mjekuese. Ditën e tretë shfaqet një rash i imtë makulopapuloz mbi faqen e

* Dërguar në redaksi në Shtator 2008, miratuar në Tetor 2008.

Nga Spitali Rajonal-Durrës.

Adresa për letërkëmbim: Sula A.: Spitali Rajonal-Durrës.