

FISURA ANALE KRONIKE. EKSCIZION ME SFINKTEROTOMI POSTERIORE APO LATERALE TË MBYLLUR?

ENTON BOLLANO, KRENAR LILAJ, ARBEN GJATA, NIKOLLAQ KAÇANI*

Summary

CHRONIC ANAL FISSURE. EXCISION WITH LATERAL OR POSTERIOR SPHINCTEROTOMY?

The chronic anal fissure is a frequent pathology of the anal canal. It represents an elliptic lesion more often localized posteriorly. Its elements are: papilla, layer and the sentinel. Many surgical techniques are involved in its treatment. In our research, we focused in the comparison of two techniques: posterior sphincterotomy and lateral sphincterotomy accompanied with anoplasty.

Purpose of the work: Evaluating which of these two techniques is more resultant in the chronic anal fissure treatment.

Material and Method used: We studied 60 patients operated in the third clinic of the surgery. 30 of these cases were treated with posterior sphincterotomy and 30 with lateral sphincterotomy. The research period lasted from November 2005–2006. The interventions were executed with help of spinal anesthesia.

Results: From the research we concluded that the FSL technique had obvious advantages in: post operational pains, healing of the wound, rectorrhage and continence.

After a year, The FSP technique resulted in six patients with incontinence against none of them who were treated with the FSL technique.

From our and other researches comparing these two techniques, we have reached to the conclusion that the FSL technique is more convenient and resultant in the chronic anal fissure treatment.

Çfarë përfaqëson fisura anale kronike

Fisura anale kronike është një patologji, e cila ka të gjitha karakteristikat e fisurës anale akute përveçse i përket shpërndarjes sipas seksit dhe moshës. Dallimi qëndron në faktin se në formën kronike pacientët kanë mbi gjashtë muaj anamnezë dhe janë gjithmonë të pranishëm tre elementët karakteristikë të saj. Këta elementë janë: papila hipertrofike, sentinela dhe në buzët e bazës fisurës janë të shprehura qartë fenomenet inflamatore. Në punimin tonë

referohen rezultatet e trajtimit të kësaj patologjie me anë të dy metodave, sfinkterotomisë posteriore dhe laterale të mbyllur e shoqëruar me ekscizion të fisurës dhe anoplastikë.

Sfinkterotomia posteriore dhe ajo laterale. Teknika. Historiku.

Fisurektomia me sfinkterotomi posteriore është realizuar për herë të parë nga Gabriel në vitin 1948. Ai realizoi ekscizionin "triangular". Ky intervent nënkupton ekscizionin me incision

* Dërguar në redaksi në Shtator 2008, miratuar në Tetor 2008.

Nga Departamenti i Kirurgjisë Speciale.

Adresa për letërkëmbim: Bollano E.: Departamenti i Kirurgjisë Speciale.